

SEGUIMIENTO DE LA URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA (UCE)



(Urticaria Activity Score) (Evaluación de la actividad de la urticaria)

Estimado paciente:

Su médico le ha propuesto llevar un registro de sus síntomas mediante la escala semanal de la actividad de la urticaria (UAS 7 por su sigla en inglés Urticaria Activity Score). Esta información es muy útil para hacer un adecuado control y seguimiento de la enfermedad, por favor realice el registro de sus síntomas y llévelos a su próxima consulta.

Para obtener un valor de UAS (Urticaria Activity Score) se debe establecer un puntaje para la cantidad de las ronchas (rango de 0 a 3) y otro para la intensidad de la picazón (rango de 0 a 3). La suma de estos dos valores es el valor diario de UAS, el cual varia en un rango de 0-6 puntos/día. Estos valores diarios se suman por los 7 días de la semana, creando el UAS 7 (rango: 0-42) (1, 2, 3). En este libro hay 8 semanas de evaluación de UAS 7 para que usted pueda llevar el control y seguimiento de la enfermedad durante 2 meses junto a su médico.

zuberinen (, Auster W, Aberor, Auduf Laufzer, Bakker D, Balliner-Weber B, et al. The EAALQUA-LENEDF/WAO guidelinier in the deminion, classification, diagnosis and anagement of utricaria. Alterny. 2018;7(7):393-414.

3. Hollis K, Proctor C, McBride D, Balp MM, McLeod L, Hunter S, et al. Comparison of Urticaria Activity Score Over 7 Days (UAS7) Values Obtained from Once-Daily and Twice-Dail Versions: Results from the ASSURE-CSU Study. Am J Clin Dermatol. 2018;19(2):267-74.

LA PUNTUACIÓN DEBE ESTABLECERSE DE ACUERDO A ESTOS CRITERIOS (1, 2, 3):

Puntuación	Número de ronchas	Intensidad de la picazón
0	Ninguna	No
	Leve	Leve
1	<20 en 4 horas	(presente pero no problemática)
	Moderado	Moderada
2	20-50 en 24 horas	(problemática pero no interfiere con la actividad diaria o el sueño)
	Intenso	Severa
3	>50 en 24 horas	(interfiere con la actividad diaria o el sueño)

^{1.} Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul Lati AH, Baker D, Ballmer-Weber B, et al. The EAACI/CA*LENEDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018;73(7):1393-44.

- Zusumann A, Daudosiuk M, Berard F, Cannicia W, Oude Eiberink H, Gimenez-Arnau A, et al. Angioedema in chronic spontaneous urticaria is underdiagnosed and has a substantial impact: Analyses from ASSURE-CSU. Allergy. 2018;73(8):1724-83.

- Allymek A, Zabewah-Janowska, Martin P, Staubscher T, Setzicher T, Mauer M. How to assess disease activity in patients with chronic urticaria? Allergy. 2008;63(6):777-80.

GUÍA DE PUNTAJE DE RONCHAS (1, 2)



PUNTAJE 0
NO HAY RONCHAS



PUNTAJE 1 MENOS DE 20 RONCHAS



PUNTAJE 2
DEBEN VERSE DE 20 A 50
RONCHAS



PUNTAJE 3
DEBEN VERSE MÁS DE 50
RONCHAS O PLACAS
(UNIÓN DE RONCHAS)

Zuberbier T, Aberer W, Asero G, Abdull Lati AH, Baker D, Ballmer-Weber B, et al. The EAACI/GA/LEN/EDF/WAG guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticatia. Allergy, 2087/37/1333-414.
Hollis K, Proctor C, McBride D, Balp MM, McLeod L, Hunter S, et al. Comparison of Urticatia Activity Score Over 7 Days (UAS7) Values Obtained from Once-Daily and Twice-Daily Versions. Results from the ASSURE-CSU usby, Am 2 Clin Dermatol. 2018/91/22677-4.

GUÍA DE PUNTAJE DE PICAZÓN (1, 2)



PUNTAJE O NO HAY PICAZÓN





PUNTAJE 1 LEVE (PRESENTE PERO NO PROBLEMÁTICO)





PUNTAJE 2 MODERADO (PROBLEMÁTICO PERO NO INTERFIERE CON LA ACTIVIDAD (INTERFIERE CON LA ACTIVIDAD DIARIA O EL SUEÑO)





PUNTAJE 3 SEVERO DIARIA O EL SUEÑO)

EJEMPLO DE REGISTRO



IMAGENES DE REFERENCIA

Roncha (1, 2, 3)

Es una erupción de tamaño variable de coloración blanca a roiiza. Está asociada con la picazón y algunas veces sensación quemante. La cantidad de ronchas que cuente debe definir el nivel en la tabla de puntuación.






Si las ronchas confluyen (se unen varias), debe considerarse una tres (1, 4).


in Succision 1, August 19, Abdul Latt. AH, Baker D, Ballmer-Weber B, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018;73(7):1393-414.


2. Powell RJ, Leber SC, Till S, Huber PAJ, Nasser SM, Clark AT. BSACI guideline for the management of chronic urticaria and angioedema. Clinical & Experimental Allergy. 2015;45(3):547-65.


^{3.} Mathias SD, Crosby RD, Rosén KE, Zazzali JL. The minimal important difference for measures of urticaria disease activity. Updated findings. Allergy Asthma Proc.


^{4.} Mathias SD, Crosby RD, Zazzali JL, Maurer M, Saini SS. Evaluating the minima-lly important diffence of the urticaria activity score and other measures of disease activity in patients with chronic idiopathic urticaria. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2012;108(1):20-4.




















Novartis de Colombia S.A: Calle 93B No. 16-31 PBX 654 44 44 Bogotá D.C. Novartis de Colombia S.A. Novartis Pharma, AG de Basilea, Suiza * = Marca registrada. Material exclusivo para el cuerpo médicio de uso educativo con pacientes. Cualquier información sobre productos que no sean de Novartis se basa en información disponible al momento de esta presentación. Mayor información en el

Departamento Médico de Novartis de Colombia S.A. Tel. 6544444 o al correo: informacion.cientifica@novartis.com. No se autoriza la grabación o toma de fotografías del material y tampoco difusión por medios no autorizados por Novartis.

Código P3: AN2103231032. Fecha de producción: 18/03/2021. Fecha de caducidad: 18/03/2023.

